

Musterlösungen Mathematik III

1. Integration

(a)

$$\int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx$$

Partielle Integration mit $u' = e^x \implies u = e^x$ und $v = \sin(x) \implies v' = \cos(x)$:

$$\int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx = [e^x \sin(x)]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^x \cos(x) dx$$

Das Integral auf der rechten Seite wird ebenfalls partiell integriert ($u' = e^x \implies u = e^x$ und $v = \cos(x) \implies v' = -\sin(x)$):

$$\int_0^{2\pi} e^x \cos(x) dx = [e^x \cos(x)]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx$$

eingesetzt ergibt sich

$$\int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx = [e^x \sin(x)]_0^{2\pi} - [e^x \cos(x)]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx$$

$$2 \cdot \int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx = [e^x \sin(x) - e^x \cos(x)]_0^{2\pi}$$

$$\int_0^{2\pi} e^x \sin(x) dx = \frac{1}{2} [e^x (\sin(x) - \cos(x))]_0^{2\pi} = \frac{1}{2} e^{2\pi} (0-1) - \frac{1}{2} (0-1) = \frac{1}{2} (1 - e^{2\pi})$$

(b)

$$\int_0^2 (\sqrt{5-2y})^{-3} dy$$

Lösung durch Substitution $u = 5 - 2y \implies du = -2dy$:

$$\int_0^2 (\sqrt{5-2y})^{-3} dy = \int_a^b u^{-\frac{3}{2}} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) du = -\frac{1}{2} \left[u^{\frac{5}{2}} \right]_a^b$$

(es werden wieder die Originalgrenzen verwendet). Rücksubstitution liefert

$$-\frac{1}{5} \left[(5-2y)^{\frac{5}{2}} \right]_0^2 = -\frac{1}{5} \left(1 - 5^{\frac{5}{2}} \right)$$

2. Doppelintegrale

(a)

$$\iint_{(A)} (3x + 4y^2) dx dy (A) : y \geq 0; 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4.$$

$R^2 = x^2 + y^2$ beschreibt einen Kreis in der x, y -Ebene. Berechnung des Integrals erfolgt in Polarkoordinaten durch Integration über φ in Grenzen von 0 bis π und r von 1 bis 2. $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ und $dA = r dr d\varphi$, also

$$\begin{aligned} \iint_{(A)} (3x + 4y^2) dx dy &= \iint_{(A)} (3r \cos \varphi + 4(r \sin \varphi)^2) r dr d\varphi \\ &= \int_0^\pi \int_1^2 3r^2 \cos \varphi dr d\varphi + \int_0^\pi \int_1^2 4r^3 \sin^2 \varphi dr d\varphi \\ &= \int_0^\pi [r^3]_1^2 \cos \varphi d\varphi + \int_0^\pi [r^4]_1^2 \sin^2 \varphi d\varphi = 7 \int_0^\pi \varphi d\varphi + 15 \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi \end{aligned}$$

3. Differentialgleichung

(a)

$$\frac{du(t)}{dt} = -(u(t))^2 + u(t) + 2u(t)t^2 + 2t - t^2 - t^4$$

$u(t) = 1 + t^2$ eingesetzt:

$$\frac{du(t)}{dt} = -(1 - t^2)^2 + 1 + t^2 + 2(1 + t^2)t^2 + 2t - t^2 - t^4$$

$$-1 + 1 - 2t^2 + t^2 + 2t^2 - t^2 - t^4 + 2t^4 - t^4 + 2t = 2t$$

$u(t) = 1 + t^2$ abgeleitet:

$$\frac{du(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(1 + t^2) = 2t$$

5. Differentialgleichungen

(a) $y' = x + 1$, Anfangsbedingung $y(-2) = -1$:

Trennung der Variablen

$$\frac{dy}{dx} = x + 1 \implies dy = (x + 1)dx$$

Integration liefert die allgemeine Lösung der DGL:

$$\int dy = \int (x + 1)dx \implies y = \frac{1}{2}x^2 + x + C.$$

Bestimmung der Konstanten C aus der Anfangsbedingung $y(-2) = -1$:

$$y(-2) = \frac{1}{2}(-2)^2 - 2 + C = -1 \implies C = -1$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{=0}$

Lösung des Anfangswertproblems ist also

$$y = \frac{1}{2}x^2 + x - 1.$$

FIXME Plot der Fkt!!

(b) $y' = 0,5(3 - y)$, Anfangsbedingung $y(0) = 2$ Trennung der Variablen:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}(3 - y) \implies \frac{dy}{y - 3} = -\frac{1}{2}dx.$$

Lösung der allgemeinen DGL:

$$\int \frac{dy}{y - 3} = -\frac{1}{2} \int dx \implies \ln |y - 3| = -\frac{x}{2} + \ln |C|$$

$$y - 3 = C \cdot e^{\frac{x}{2}} \implies y = 3 + C \cdot e^{\frac{x}{2}}.$$

Lösung des Anfangswertproblems:

$$y(0) = 3 + C \cdot e^{\frac{0}{2}} = 2 \implies C = -1$$

$$y(x) = 3 - C \cdot e^{\frac{x}{2}}$$

(c) $y(1 - x^2)y' - x(1 - y^2) = 0$ Trennung der Variablen:

$$\frac{ydy}{1 - y^2} = \frac{xdx}{1 - x^2}$$

Substitution vereinfacht die Integrale: $u = 1 - y^2, du = -2ydy$ und $v = 1 - x^2, dv = -2xdx$, also

$$\int \frac{du}{u} = \int \frac{dv}{v} \implies \ln |u| = \ln |v| + \ln |C|.$$

Rücksubstitution liefert

$$\ln |1 - y^2| = \ln |1 - x^2| + \ln |C| \implies 1 - y^2 = 1 - x^2 + C$$

$$\implies y^2 = 1 - C(1 - x^2)$$

(d) $(x^2 - 1)y' = 2y$ Trennung der Variablen:

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{2dx}{x^2 - 1}$$

Integration durch Partialbruchzerlegung: Nullstellen des Nenners sind $x_1 = 1, x_2 = -1$.

$$\frac{2}{x^2 - 1} = \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}$$

$$\ln |y| = \ln |x - 1| - \ln |x + 1| + \ln |C| = \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + \ln |C|$$

$$\implies y = C \cdot \frac{x - 1}{x + 1}$$

6. Fourierzerlegung

Die Fourier-Reihe ist mit der Funktion identisch

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

für die 2π -periodische Funktion

$$\begin{aligned} f(x) &= 3,74 + 1,5 \cdot \sin(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx) \\ &= \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + b_1 \sin(x) + a_2 \cos(2x) + b_2 \sin(2x) + \dots \end{aligned}$$

Bei Koeffizientenvergleich bleiben lediglich zwei Fourierkoeffizienten, die nicht verschwinden:

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} &= 3,74 \implies a_0 = 7,48 \\ b_1 \sin(x) &= 1,5 \cdot \sin(x) \implies b_1 = 1,5 \end{aligned}$$

7. Luft...

a) Der Ballon wird durch die Gravitation nach unten beschleunigt:

$$F_G = m \cdot g = m \cdot \dot{v}(t),$$

die Reibungskraft wirkt dagegen

$$F_R = -k \cdot v(t).$$

Man erhält die Differentialgleichung, indem die Summe der Kräfte gebildet wird:

$$\begin{aligned} m \cdot \dot{v}(t) &= F_G + F_R = m \cdot g - k \cdot v(t) = 0 \\ \dot{v}(t) + \frac{k}{m} \cdot v(t) &= g, \end{aligned}$$

es handelt sich um eine lineare, inhomogene DGL 1. Ordnung mit konstanten Koeffizienten.

b) Lösung über die zugehörige homogene DGL

$$\dot{v}_0(t) + \frac{k}{m}v(t) = 0 \Rightarrow v(t) = C \cdot e^{-\frac{k}{m}t}.$$

Die Störfunktion $f(t) = g$ ist konstant, wir wählen als Ansatz eine Konstante

$$v_p(t) = A \Rightarrow \dot{v}_p(t) = 0.$$

Einsetzen liefert die partikuläre Lösung $v_p(t)$:

$$\dot{v}_p(t) + \frac{k}{m}v_p(t) = 0 + \frac{k}{m}A = g = 0 \Rightarrow A = v_p(t) = \frac{gm}{k}$$

Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung ist die Summe der beiden gefundenen Funktionen

$$v(t) = v_0(t) + v_p(t) = C \cdot e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{gm}{k}$$

c) Für den Parameter $\frac{k}{m} = 81/s$ folgt

$$v(t) = C \cdot e^{8t/s} + \frac{g m}{8 s}.$$

Für große Zeiten ($t \rightarrow \infty$) verschwindet der exponentielle Term, also ist die Endgeschwindigkeit

$$v_e = \frac{g m}{8 s} \approx 1,25m/s.$$

8. Ein Anfangswertproblem

a) Es liegt eine Differentialgleichung 1. Ordnung mit einer Randbedingung vor \Rightarrow es gibt genau eine Lösung.

b) Lineare, inhomogene DGL 1. Ordnung:

$$y' + \tan(x)y = 5 \sin(2x)$$

$$y'_0 + \tan(x)y_0 = 0 \text{ (zugehörige homogene DGL)}$$

$$\Rightarrow y_0(x) = C \cdot e^{-\int \tan(x)dx} = C \cdot e^{-(-\ln|\cos(x)|)} = C \cdot \cos(x).$$

Die inhomogene DGL wird über Variation der Konstanten gelöst:

$$y(x) = C(x) \cos(x)$$

$$y'(x) = C'(x) \cos(x) - C(x) \sin(x)$$

$$y' + \tan(x)y = C'(x) \cos(x) - C(x) \sin(x) + \tan(x)C(x) \sin(x) = 5 \sin(2x)$$

$$C'(x) \cos(x) = 5 \sin(2x)$$

Ausnutzen des Additionstheorems $\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \sin(y)\cos(x)$ liefert sofort

$$C'(x)\cos(x) = 5\sin(x+x) = 5 \cdot 2\sin(x)\cos(x)$$

$$C'(x) = 10\sin(x)$$

$$C(x) = 10 \int \sin(x)dx = 10 \cdot (-\cos(x) + K)$$

Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung lautet

$$y(x) = 10(K + \cos(x)) \cdot \cos(x).$$

Für die Lösung des Anfangswertproblems fehlt noch die Bestimmung der Konstanten über die Gleichung $y(3\pi) = 2$:

$$y(3\pi) = 10(K + \cos(3\pi))\cos(3\pi) = 2$$

$$10(K + (-1)) \cdot (-1) = 2$$

$$K = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

$$y(x) = 10 \left(\frac{4}{5} + \cos(x) \right) \cdot \cos(x)$$